Heracleum mantegazzianum

Bekämpfung im Natura 2000 Gebiet
„Salzstellen bei Sülldorf“

Landschaftspflegeverband „Grüne Umwelt“ e.V.
39171 Sülzetal
Claudia Bohner

Projektgebiet



Projektgebiet



modifiziert nach: Google Maps - © 2012 Google

Je nach Standort Einsatz verschiedener Methoden.

→ Herbizide → Abflammen → mechanisch

Garlon 4 (Triclopyr)

- Rückenspritze 1%

7d nach Garlon 4

Garlon 4 (Triclopyr)

- Rückenspritze 1%

7d nach Garlon 4

Garlon 4 (Triclopyr)

- 4 Wochen nach Garlon 4 *(Regen)*

Garlon 4 (Triclopyr)

- 17 d nach Garlon 4

Garlon 4 (Triclopyr)

- 8 Wochen nach Garlon 4

RoundUp (Glyphosat)

- Dochtstreichgerät 33%

1 Woche nach RoundUp

3 Wochen nach RoundUp

Abflammen

• bei schwierigem Untergrund (Steine, Pflaster), wenn Wurzelstich nicht möglich ist

ca. 4 Wochen nach Abflammen

Abflammen

- Jungpflanzen auf Grünland ca. 2 Wochen nach Abflammen

Wurzelstich

- Jungpflanzen einzeln → Wurzelstich

8 d nach Wurzelstich

Mahd

- flächiger Bestand auf Grünland

3 Wochen nach Mahd

Abschlagen / Blütenschnitt

- Abschlagen = kurzfristiger Zeitgewinn

7d nach Abschlagen

Blütenschnitt

- Entsorgung der Blütenstände als „letzte“ Möglichkeit

Wahl der Methoden im Projektgebiet

- Anzahl der Pflanzen
- Witterung
- Standort / verfügbare Mittel
- Zeitrahmen

Bekämpfung konsequent verfolgen !!

www.artikelmagazin.de

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!